



1. Inhalation vorbereiten

Entfernen Sie zunächst die Schutzkappe auf dem Mundstück durch leichtes Zusammendrücken auf der Seite und Abziehen nach vorne.



Drücken Sie die farbige Dosiertaste bis zum Anschlag kräftig nach unten: Sie hören ein Klicken und die Farbe des Kontrollfensters wechselt von **ROT** nach **GRÜN**. Vergessen Sie nicht, die Taste wieder los zu lassen.



2. Inhalation durchführen

- Zunächst langsam tief ausatmen, aber nicht in den Pulverinhalator!
- Das Mundstück mit den Lippen fest umschließen.
- Rasch, kräftig und möglichst tief einatmen. Ein deutliches Klicken zeigt die korrekte Inhalation an, außerdem wechselt die Farbe in dem Kontrollfenster wieder auf **ROT**.
- Zusätzlich schmecken Sie den Trägerstoff Lactose (süßlicher Geschmack).
- Langsam ausatmen – bevorzugt über die Nase oder mit der „Lippenbremse“
- Bitte setzen Sie die Schutzkappe nach der Inhalation wieder auf.



Wenn vorne am Zahlenfenster eine schraffierte Null erscheint, muss eine neue Patrone eingesetzt werden. Das Einsetzen einer neuen Patrone erfolgt wie unter "Nachfüllen" beschrieben.

Um das Risiko einer Pilzinfektion zu verringern, spülen Sie nach der Inhalation Mund und Rachen mit Wasser aus **OHNE** es hinunterzuschlucken.